

Листок 1: кольца и модули, повторение

Задачи по коммутативной алгебре - матфак ВШЭ

надо сдать до 21.09.2010 включительно

Предполагается, что студенты знакомы с определениями кольца и модуля над кольцом. Все кольца будут ассоциативными, коммутативными, с единицей. Напомним, что идеал I в кольце A - это подмодуль A как модуля над собой, то есть подгруппа A по сложению, стабильная относительно умножения на все элементы кольца. Фактормодуль A/I тогда обладает структурой кольца (т.е. умножение по правилу $(a+I)(b+I) = ab+I$ корректно определено) и называется факторкольцом A по идеалу I . Идеал, порожденный элементами a_1, \dots, a_k , обозначается (a_1, \dots, a_k) . Идеал, не совпадающий со всем кольцом, называется простым, если из $xy \in I$ следует $x \in I$ или $y \in I$, и максимальным, если он не содержится ни в каком другом собственном идеале. Область главных идеалов - это целостное кольцо, где любой идеал порожден одним элементом.

Сумма идеалов - это идеал, который они порождают. Произведение идеалов - это идеал, порожденный произведениями их элементов, по одному из каждого идеала-сомножителя.

1 Докажите, что A - поле, если и только если в A нет идеалов, кроме (0) и (1) .

2 Пусть идеал I прост (соответственно, максимален). Что можно сказать о факторкольце A/I ? Докажите, что максимальный идеал прост.

3 Докажите существование максимальных идеалов, а также то, что любой идеал содержится в максимальном (указание: используйте лемму Цорна).

4 Докажите, что в области главных идеалов следующие условия эквивалентны для ненулевого идеала I : (1) I прост; (2) I максимален; (3) I порождается неприводимым элементом.

5 Опишите простые идеалы в $\mathbf{Z}[X]$ (удобно вначале посмотреть на пересечение такого идеала с \mathbf{Z}).

6 Идеалы I и J называются взаимно простыми, если $I + J = A$. Докажите, что если I_1, \dots, I_k попарно взаимно просты, то $I_1 I_2 \dots I_k = \bigcap_{1 \leq l \leq k} I_l$.

7 Китайская теорема об остатках: пусть A кольцо, I_1, \dots, I_k идеалы, $p : A \rightarrow A/I_1 \times \dots \times A/I_k$, $p : a \mapsto (a + I_1, \dots, a + I_k)$. Докажите, что p сюръективно в том и только в том случае, когда I_1, \dots, I_k попарно взаимно просты.

Напомним, что короткая точная последовательность - это диаграмма вида $0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$, где ядро каждой стрелки есть образ предыдущей стрелки, то есть $\text{Ker}(v) = \text{Im}(u)$, u инъекция, а v сюръекция; иначе говоря, M'' есть фактор M по M' .

8 Расщепление короткой точной последовательности модулей: пусть $0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$ - короткая точная последовательность A -модулей. Показать, что следующие утверждения эквивалентны:

- а) существует такой гомоморфизм $r : M \rightarrow M'$, что $ru = id_{M'}$
- б) существует такой гомоморфизм $s : M'' \rightarrow M$, что $vs = id_{M''}$
- в) существует такой изоморфизм $\phi : M \rightarrow M' \oplus M''$, что $\phi(u(m')) = (m', 0)$ для $m' \in M'$ и $v = pr_{M''} \cdot \phi$, где $pr_{M''}$ - проекция на M'' .

9 Докажите, что в короткой точной последовательности, в обозначениях предыдущего упражнения: если M конечно порожденный A -модуль, то и M'' тоже; если M' и M'' конечно порождены, то и M тоже. Верно ли, что если M конечно порожден, то и M' тоже? Покажите, что это верно при условии, что M'' свободен (т.е. изоморфен A^n).

10 Алгебра над A называется конечной, если она конечно порождена как A -модуль. Докажите, что конечная алгебра без делителей нуля над полем сама является полем. Выведите отсюда, что любой простой идеал в конечной алгебре над полем максимален.