

Квантовая теория поля

Листок 4.

Обязательные задачи: 1, 2.

1. Рассмотрим струну длины a , массы σ на единицу длины и натяжения T , закрепленную на концах. Лагранжева плотность малых поперечных колебаний $\varphi(x, t)$ струны имеет вид

$$\mathcal{L} = \frac{\sigma}{2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)^2 - \frac{T}{2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2.$$

Выведите уравнения движения. Разлагая φ в ряд Фурье

$$\varphi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right) q_n(t),$$

покажите, что

$$\int_0^a \mathcal{L} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sigma}{2} \dot{q}_n^2 - \frac{T}{2} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2 q_n^2 \right).$$

Убедитесь, что колеблющаяся струна эквивалентна бесконечному количеству независимых гармонических осцилляторов с частотами

$$\omega_n = \frac{\pi n}{a} \sqrt{\frac{T}{\sigma}}.$$

2. Метод Лапласа. Пусть $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкие функции, причем f достигает глобального минимума только в одной точке $c \in (a, b)$, $f''(c) > 0$. Покажите, что

$$\int_a^b g(x) e^{-f(x)/h} dx = \sqrt{2\pi h} e^{-f(c)/h} I(h),$$

где $I(h)$ доопределяется в нуле $I(0) := \frac{g(c)}{\sqrt{f''(c)}}$ до гладкой функции на $[0, \infty)$.

3. Применяя метод Лапласа к Γ -функции

$$\Gamma(s+1) = \int_0^{\infty} t^s e^{-t} dt = s^{s+1} \int_0^{\infty} e^{-s(x - \ln x)} dx,$$

выведите формулу Стирлинга: $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + O(1/n))$.

4. Рассмотрим теорию трех скалярных полей φ_i , $i = 1, 2, 3$, с лагранжианом

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 (\partial_\mu \varphi_i \partial^\mu \varphi_i - m^2 \varphi_i^2),$$

обладающую глобальной $O(3)$ -симметрией. Вводя дополнительные калибровочные поля A_μ^a , постройте теорию, обладающую локальной (калибровочной) $O(3)$ -симметрией и сводящуюся к исходной при $A_\mu^a \equiv 0$.