


Темы курсовых работ
профессор А.Л.Городенцев

1 курс	<ol style="list-style-type: none">Лемма Барта: если ранг коммутатора двух линейных операторов равен единице, то у этих операторов есть общий собственный вектор (над алгебраически замкнутым полем). Решение можно подсмотреть в сборнике задач по линейной алгебре, составленном В.Прасоловым, но правильнее решить эту задачу самостоятельно.Гладкая плоская кубическая кривая не допускает рациональной параметризации. И.Р.Шафаревич. <i>Основы алгебраической геометрии, т.1.</i> М.Рид. <i>Алгебраическая геометрия для всех,</i> а также задачи 1.6 и 5.1 (соответственно, из 1-го и 5-го листков) курса A.L.Gorodentsev. Algebraic Geometry. Start Up Course, читаемого в Math In Moscow.Решение (в целых числах) уравнения Пелля $x^2 + d y^2 = N$ и группа единиц вещественного квадратичного поля. К.Айрлэнд, М.Роузен. <i>Классическое введение в современную теорию чисел.</i> (§5 из гл.17) З.И.Боревич, И.Р.Шафаревич. <i>Теория чисел.</i> (§8 из гл.II) а также задачи А.Л.Городенцева, выдававшихся на семинаре Рудакова.Теорема Лиувилля о том, что алгебраические числа приближаются рациональными дробями не лучше, чем с точностью до некоторой натуральной степени знаменателя дроби А.Я.Хинчин. <i>Цепные дроби.</i> (§9 из гл.2)Цепочка Клиффорда. Имеется следующая серия задач, занумерованных натуральными числами n, начиная с $n=4$. При $n=4$ четыре прямые на плоскости, находящихся в общем положении (любые две пересекаются в одной точке, через которую не проходит никакая третья), ограничивают 4 треугольника. Оказывается, что описанные вокруг этих треугольников окружности пересекаются в одной точке, а их центры лежат на одной окружности. При $n=5$ пять прямых в общем положении содержат внутри себя 5 четвёрок прямых, с каждой из которых, согласно предыдущему, связана точка пересечения четырёх окружностей, и окружность, проходящая через их центры. Оказывается, что эти 5 точек лежат на одной окружности, а пять окружностей - пересекаются в одной точке, а их центры лежат на одной окружности. При $n=6$ имеется 6 пятёрок прямых, каждая из которых, по предыдущему, производит: (1) окружность, на которой лежат 5 точек пересечения четвёрок окружностей, (2) точку пересечения пяти окружностей (3) окружность, проходящую через центры 5 окружностей. Разумеется, шесть окружностей (1) пересекаются в одной точке, а их центры лежат на одной окружности; для шести окружностей (3) это, конечно, тоже верно; а шесть точек (2) лежат на одной окружности. И так далее. Историю вопроса и одно из возможных (и довольно таки старинных) решений с весьма оригинальным использованием комплексных чисел см. на сайтах http://www.gogeometry.com/clifford1.htm и http://www.maa.org/editorial/knot/CenterCircle.html.
--------	--

6. **Поризм Понселе**, простая часть: на плоскости (комплексной проективной) нарисованы две коники и приверженцам



евклидовой геометрии рекомендуются представлять себе эллипс, лежащий внутри другого эллипса); из точки на одной из них (на внешнем эллипсе) выпускают касательную к другой (к внутреннему эллипсу) пока она снова не пересечёт первую конику (внешний эллипс); из полученной точки пересечения с первой коникой снова выпускают касательную ко второй конике до её пересечения с первой и т.д. — получается ломаная, вписанная в первую конику и описанная около второй; если эта ломаная замкнётся через n шагов в n -угольник, вписанный в первую конику и описанный около второй, то это явление будет иметь место *при любом выборе начальной точки на первой конике*, за исключением, разве что, конечного числа точек (в этом случае говорят, что две данные коники замкнуты друг с другом по Понселе).

J.G.Semple, G.T.Kneebone. *Algebraic projective geometry*;

J.G.Semple, L.Roth. *Introduction to algebraic geometry*;

а также лекцию 3 из курса A.L.Gorodentsev. *Algebraic Geometry. Start Up Course*, читаемого в Math In Moscow.

7. **Теорема Безу** о том, что две кривые степеней m и n без общих компонент на плоскости (комплексной проективной) имеют ровно mn точек пересечения (если учитывать их с надлежащими кратностями, определяемыми простым и наглядным правилом Цейтена).

P. Уокер. *Алгебраические кривые*;

J.G.Semple, G.T.Kneebone. *Algebraic projective geometry*;

J.G.Semple, L.Roth. *Introduction to algebraic geometry*;

а также лекции 10, 11 из курса A.L.Gorodentsev. *Algebraic Geometry. Start Up Course*, читаемого в Math In Moscow.

1-2 курс

8. **Теорема Дирихле о единицах** - одно из естественных развитий предыдущего сюжета (п.3 для 1 курса). Источники те же:

	<p>К.Айрлэнд, М.Роузен и З.И.Боревич, И.Р.Шафаревич.</p> <p>9. Теорема Лагранжа о представлении вещественных квадратичных иррациональностей периодическими цепными дробями. А.Я.Хинчин. <i>Цепные дроби.</i> (§10 из гл.2) а также задачи А.Л.Городенцева выдававшиеся на contra-семинаре 2008/09 года.</p> <p>10. Теорема Рота о том, что для трансцендентности вещественного числа необходимо и достаточно, чтобы оно имело бесконечно много приближений p/q с точностью до $q^{-2-\varepsilon}$ см п.4 для 1 курса Дж.В.С.Касселс. <i>Введение в теорию диофантовых приближений.</i> (гл.VI) P.M.Gruber, C.G.Lekkerkerker. <i>Geometry of numbers.</i></p> <p>11. Поризм Понселе, трудная часть: как по уравнениям двух коник выяснить, существуют ли для них вписанно-описанные многоугольники. P.Griffiths, J.Harris, On Cayley's explicit solution to Poncelet's porism. <i>L'Enseignement Mathematique</i>, Vol.24 (1978)</p> <p>12. Соотношения Плюккера: у плоской алгебраической кривой, особые точки которой исчерпываются к простыми острями (где двойная касательная пересекает кривую с кратностью 3) и n простыми самопересечениями кратностей m_1, \dots, m_n (в i-той точке пересекается m_i ветвей с различными касательными), число ι точек перегиба, степень d, и класс c (т.е. число касательных, которые можно опустить на кривую из точки общего положения) связаны соотношениями $c = d(d-1) - 3\kappa - \sum m_i(m_i-1)$ и $\iota = 3d(d-2) - 8\kappa - 3\sum m_i(m_i-1)$ лекции 10, 11 из курса A.L.Gorodentsev. Algebraic Geometry. Start Up Course, читаемого в Math In Moscow.</p>
1-3 курс	<p>13. Цепочка Маркова. Связь между: целыми решениями уравнения Маркова $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$; вещественными числами, которые хуже всего приближаются рациональными; вполне приводимыми над R целочисленными квадратичными формами $F(x,y)$ с максимальными минимумами величины $F(x,y)/\det^{1/2}(F)$ по всем целым ненулевым (x,y); исключительными векторными расслоениями на проективной плоскости. Естественное обобщение этой задачи - связь между цепочкой вполне вещественных кубических форм от трёх переменных и исключительными расслоениями на проективном пространстве до сих пор не изучена, а от самой этой цепочки форм вообще известно только самое начало - первые две формы (с наибольшим минимумом и следующим за ним), построенные Давенпортом в 1939-1943 г.г. С этой же задачей связана до сих пор не решённая проблема Маркова: пусть у двух троек решений уравнения Маркова совпадают максимальные элементы; верно ли, что это совпадающие тройки решений? Дж.В.С.Касселс. «Введение в теорию диофантовых приближений». A.L.Gorodentsev. S.A.Kuleshov. «Helix theory» <i>Moscow Math. J.</i> 4:2 (2004), p.377--440.</p>
2-3 курс	14. На любой гладкой кубической поверхности в трёхмерном

	<p>пространстве (комплексном проективном) лежит ровно 27 прямых.</p> <p>М.Рид. <i>Алгебраическая геометрия для всех</i> (§8 из гл.V), а также лекцию 14 из курса A.L.Gorodentsev. Algebraic Geometry. Start Up Course, читаемого в Math In Moscow. Можно вывести этот результат из того, что гладкая плоская кривая степени 4 имеет 28 двойных касательных (что следует из предыдущих соотношений Плюккера).</p> <p>15. Описание кольца когомологий комплексного грассманиана (исчисление Шуберта).</p> <p>У. Фултон. «Таблицы Юнга и их применение в ...» и его же «Теория пересечений»</p> <p>Ф.Гриффитс, Дж.Харрис. «Принципы алгебраической геометрии» гл. 4.</p>
3 курс-магистратура	<p>16. Построение полуортогонального разложения производной категории когерентных пучков на проективных пространствах и грассманианах. Изучение действия группы кос на полуортогональных базисах производных категорий и решёток Мукаи.</p> <p>A.L.Gorodentsev, S.A.Kuleshov. «Helix theory» <i>Moscow Math. J.</i> 4:2 (2004), p.377--440. А также имеющиеся там ссылки.</p> <p>17. Описание алгебры сизигий проективной координатной алгебры грассманиана $Gr(k,n)$. В настоящее время ответы известны только для $k=2$ (при всех n) и для $k=3, n=5$.</p> <p>A.L.Gorodentsev, A.S.Khoroshkin, A.N.Rudakov. On syzygies of highest weight orbits. In: <i>Moscow Seminar on Mathematical Physics, II</i>. AMS Translations, ser. 2, vol. 221 (2007), p. 79--120.</p>
3-4 курс, Магистратура Темы для группы из 2-3 человек	<p>18. (3-6 курс)</p> <p>Алгебраическое векторное расслоение на комплексной проективной прямой является прямой суммой одномерных расслоений $\mathcal{O}(d)$ (теорема Биркгофа-Гротендика). Неубывающая последовательность чисел s_d, встречающихся в разложении данного расслоения называется типом расщепления этого расслоения. Задача: описать типы расщеплений ограничений на прямую исключительных расслоений на комплексных проективных пространствах. У меня нет сомнений, что описание типа расщепления ограничения на прямую исключительного расслоения на плоскости должно быть тесно связано с марковским описанием периодов из единиц и двоек, встречающихся в разложениях марковских квадратичных иррациональностей в непрерывные дроби. Подзадача: проверить эту догадку. Я считаю, что типы расщеплений ограничений исключительных расслоений с проективных пространств размерностей три и выше должны быть тесно связаны с диофантовыми приближениями вполне вещественных иррациональностей старших степеней.</p> <p>Об исключительных расслоениях можно прочесть в книге Rudakov A.N., et al. <i>Helices and vector bundles</i> [Seminaire Rudakov, CUP, 1990] (есть в колхозе)</p> <p>Известно, что все они стабильные, однородные, равномерные и вообще максимально хорошие.</p>

О числах Маркова см. материалы к моему докладу 13 октября 2008 года на семинаре http://vyshka.math.ru/f08/08F_sem_rudakov.html оригинальную работу Маркова "О квадратичных формах положительного определителя" (первая статья в томе сочинений Маркоа по теории чисел, что есть в колхозе), а также гл. 2 книгу Дж.Касселс "Диофантовы приближения"

О расслоениях на проективных пространствах (в частности, теореме Грауэрта о том, что при ограничении стабильного расслоения на проективном пространстве на прямую соседние числа получающегося типа расщепления разнятся не более, чем на 1) можно прочесть в книге Оконека, Шпендлера, Шнайдер "Векторные расслоения на комплексных проективных пространствах" (есть в колхозе)

- 19.** Симплектическое торическое многообразие - это $2n$ -мерное симплектическое многообразие, обладающее n коммутирующими гамильтонианами, которые сносят его над выпуклым многогранником в \mathbb{R}^n со слоями - вещественными компактными торами (n -мерным над внутренними точками многогранника и вырождающимися на коразмерность грани над точками граней) Алгебраические торические многообразия вписываются в эту конструкцию (в качестве многогранника получится многогранник, кодирующий веер алгебраического торического многообразия). Имеются три замечательных интегрируемых системы, вписывающиеся в эту картинку, расслоенные над одним и тем же многогранником и могущие быть преобразованы одна в другую послойным симплектоморфизмом. Сиречь: многообразие модулей многоугольников (n -угольников) в \mathbb{R}^3 с заданными длинами сторон, многообразие модулей параболических 2-расслоений над прямой с выколотыми точками и комплексный грассманиан $Gr(2, n)$. В курсовой работе требуется разобраться с каждой из этих интегрируемых систем (в первых двух понять, а что это вообще за многообразие, какова симплектическая структура, что за n коммутирующих гамильтонианов, как устроен n -мерный многогранник на который они отображают систему, как переходить от одной системы к другой посредством послойных симплектоморфизмов). Это всё более-менее известно (но ждёт обобщений) и написано в статьях:

arXiv:0810.3470

Toric degenerations of Gelfand-Cetlin systems and potential functions
Takeo Nishinou, Yuichi Nohara, Kazushi Ueda

arXiv:0812.0066

Potential functions via toric degenerations
Takeo Nishinou, Yuichi Nohara, Kazushi Ueda

и ссылках, которые в них даются. Новое и неизвестное: исследовать обобщённые уравнения Книжника-Замолотчикова на этих системах (как я объяснял в докладе по абелевой лагранжевой алгебраической геометрии на семинаре лаборатории прошлым июнем, обобщённое уравнение Книжника-Замолотчикова описывает связь между базисами в пространствах глобальных голоморфных сечений голоморфного расслоения предквантования

	<p>на соответствующем келеровом торическом многообразии и комбинаторными данными, описывающими вещественную интегрируемую систему, расслоенную на торы над многогранником; в основе описания лежат торы Бора-Зоммерфельда, коих имеется конечное число в слоях вещественного расслоения на торы, и с каждым из которых связано базисное голоморфное сечение расслоения предквантования в голоморфной картинке).</p>
--	---