

## Листок 2. Движения пространства и векторное произведение.

Werde der du bist<sup>1</sup>. *J. W. Goethe*

1. Найдите все а) повороты, б) осевые симметрии, в) движения, переводящие в себя множество вершин квадрата на плоскости.
2. То же для правильного треугольника на плоскости.
3. а) Найдите все параллельные переносы пространства, переводящие данный куб в себя.  
б) То же для центральных симметрий.  
в) То же для зеркальных симметрий.  
г) То же для осевых симметрий.

*Вращением* пространства вокруг ориентированной прямой  $l$  на угол  $\alpha$  называется отображение  $R_l^\alpha$  пространства, которое каждую точку прямой  $l$  оставляет на месте и каждой точке  $X$  пространства, не лежащей на прямой  $l$ , ставит в соответствие точку  $X'$ , определяемую так: берем проекцию  $O$  точки  $X$  на  $l$ , проводим плоскость  $XOX'$  ортогонально прямой  $l$ , так что  $OX = OX'$  и угол  $XOX'$  в этой плоскости равен  $\alpha$  (положительное направление отсчета углов в плоскости  $XOX'$  согласовано с ориентацией пространства и прямой  $l$  по правилу буравчика). *Поворотной симметрией* пространства называется композиция вращения и зеркальной симметрии относительно плоскости, перпендикулярной оси вращения (или, эквивалентно, композиция вращения и центральной симметрии относительно точки, лежащей на оси вращения).

4. а) Ось любого вращения пространства, переводящего данный куб в себя, проходит либо через вершину, либо через середину ребра, либо через центр грани.  
б) Найдите все вращения пространства, переводящие данный куб в себя.  
в) То же для поворотных симметрий.  
г) То же для движений.

Для каждого типа движений нарисуйте куб и движение (приветствуются красивые цветные рисунки), укажите перестановку вершин куба, реализуемую этим движением, и число движений такого типа.

5. То же для правильного тетраэдра.
6. Постройте биекцию, сохраняющую композицию, между найденным в задачах 1, 2, 4б, 4г, 5 множеством движений и некоторым подмножеством группы перестановок  $n$ -элементного множества (с минимально возможным числом  $n$ ).

<sup>1</sup>Стань самим собой. — Пер. с нем.

7. Докажите:

- а) тождество 'бац минус цаб':  $[\vec{A}, [\vec{B}, \vec{C}]] = \vec{B}(\vec{A}, \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A}, \vec{B})$ ;  
 б) тождество Якоби:  $[\vec{A}, [\vec{B}, \vec{C}]] + [\vec{B}, [\vec{C}, \vec{A}]] + [\vec{C}, [\vec{A}, \vec{B}]] = 0$ .

Последующие задачи посвящены доказательству следующей непростой теоремы:

**Теорема Хъемслева–Морли.** Пусть  $a$ ,  $b$  и  $c$  — три попарно непараллельные прямые в пространстве. Обозначим через  $a'$  общий перпендикуляр к паре прямых  $b$  и  $c$ . Далее, обозначим через  $a''$  общий перпендикуляр к паре прямых  $a$  и  $a'$  (дано, что эти прямые непараллельны). Аналогично определим прямые  $b''$  и  $c''$ . Тогда  $a''$ ,  $b''$ ,  $c''$  имеют один общий перпендикуляр (т.е. прямую, пересекающую их все и перпендикулярную им всем).

8. а) Докажите эту теорему в случае, когда  $a$ ,  $b$ ,  $c$  лежат в одной плоскости.  
 б) То же для случая, когда  $a$ ,  $b$ ,  $c$  проходят через одну точку.  
 в) Докажите, что  $a''$ ,  $b''$  и  $c''$  параллельны одной плоскости (для любых  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ).

Прямую в пространстве можно задать следующим уравнением:

$$[u, x] = v.$$

Здесь  $u$  и  $v$  — фиксированные перпендикулярные друг другу векторы, а  $x$  — радиус-вектор переменной точки. Векторы  $u$  и  $v$  можно построить по данной прямой так: взять две точки  $A$  и  $B$  на этой прямой и положить  $u = AB$ ,  $v = [OA, OB]$ .

Пусть  $(u; v)$  и  $(u'; v')$  — две пары векторов. Назовем их *произведением* пару  $(u''; v'')$ , где  $u'' = [u, u']$  и  $v'' = [u, v'] + [v, u']$ . Определим *сумму* пар векторов покомпонентно:  $(u; v) + (u'; v') = (u + u'; v + v')$ . Пары  $(u; v)$  поставим в соответствие прямую  $[u, x] = pr v$ , где  $pr v$  — проекция вектора  $v$  на плоскость, перпендикулярную вектору  $u$ .

9. а) Прямые  $[u, x] = v$  и  $[u', x] = v'$  пересекаются (или параллельны), если и только если  $(u, v') + (v, u') = 0$ .  
 б) Наше соответствие переводит произведение в общий перпендикуляр.  
 в) Произведение пар векторов удовлетворяет тождеству Якоби.

10. Докажите теорему Хъемслева–Морли.