

ЛИСТОК 10. ИНТЕГРАЛЫ

АНАЛИЗ, 1 КУРС, 07.03.2017

10◦1 Посчитать интегралы (обязательная задача!): $\int \frac{x \, dx}{x^2 - 3x + 2}$, $\int \frac{x \, dx}{x^2 + 2x + 5}$,

$$\int e^{|x|} \, dx, \quad \int \frac{e^{3x} \, dx}{e^x + 1}, \quad \int \frac{(2-x)^2 \, dx}{2-x^2}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}}, \quad \int \frac{dx}{1+\sin x}, \quad \int \operatorname{tg}^2 x \, dx$$

10◦2 В параболическую тарелку (параболоид вращения в \mathbb{R}^3 с вертикальной осью) высоты h и радиуса R подали обед. Сколько супа в неё влезет?

10◦3 По трубе радиуса R течёт нефть, причём скорость течения растет прямо пропорциональна расстоянию от стенки трубы, достигая максимального значения v_0 м/сек в середине трубы. Какова пропускная способность этой трубы?

10◦4 Момент вращения отрезка $I = [0, 1]$ с непостоянной плотностью $p(x) = x^s$ (где $s > 0$) относительно точки $a \in \mathbb{R}$ вычисляется по формуле $J_a = \int_0^1 p(x)(x-a)^2 \, dx$. Найдите минимальное значение момента вращения J_a и соответствующую точку a^* .

10◦5 Винт вертолёта, взлетающего с постоянной скоростью v , вращается с постоянной угловой скоростью w . По лопасти винта от его оси бежит колорадский жук с постоянной скоростью u . Найдите длину траектории колорадского жука за один полный оборот винта вертолёта, если в начальный момент времени он сидел на оси винта.

10◦6 Найдите работу силы Архимеда при погружении золотого шара радиуса R в ванну с водой до середины шара. (Примечание: Требуется работа, а не сила!)

10◦7 Определите силу давления воды на вертикальную стенку, имеющую форму полуокруга радиуса ρ , диаметр которого находится на поверхности воды.

10◦8 Циклоидой называется траектория фиксированной точки на окружности радиуса R катящейся без скольжения по прямой. Найдите параметризацию циклоиды и длину её дуги, отвечающей полному обороту окружности.

10◦9 Цилиндр диаметра 20 см и длины 80 см заполнен паром под давлением 10 кг/см². Какую работу надо затратить, чтобы уменьшить объём пара в два раза, считая, что температура пара остаётся постоянной?

10◦10 Бокал в форме поверхности вращения радиуса $R(z) = z^{2/3}$ на высоте z от дна наполняют из постепенно иссякаемого источника, скорость истечения из которого равна $e^{-t} \cos^2 t$. До какой высоты H сможет наполниться бокал?

10◦11 Докажите вторую теорему Гульдена: объём тела, образованного вращением плоской фигуры S вокруг не пересекающей её оси, расположенной в плоскости фигуры, равен произведению площади фигуры S на длину окружности, описываемой центром тяжести этой фигуры.