

3. Деревья

Граф называется *деревом*, если он связен и не содержит несамопересекающихся циклов. *Стволом графа* называется любой его подграф, являющийся деревом и содержащий все вершины графа

- 3.1.** а) В любом дереве найдется *лист*, т.е. вершина степени 1.
 б) Связный граф с n вершинами является деревом тогда и только тогда, когда в нем $n - 1$ ребро.
 в) Граф является деревом тогда и только тогда, когда между любыми двумя его вершинами существует единственный несамопересекающийся путь.
 г) Последовательность из n натуральных чисел является последовательностью степеней вершин некоторого дерева тогда и только тогда, когда сумма ее членов равна $2n - 2$.

Далее будем рассматривать графы с занумерованными вершинами (т.е. графы, а не их классы изоморфизма).

- 3.2.** Каких графов с данными n вершинами больше:
 а) имеющих изолированную вершину или не имеющих?
 б) связных или несвязных?

- 3.3 (Формула Кэли).** а) Число деревьев с данными n вершинами равно n^{n-2} .
 б) Пусть $d_1 + \dots + d_n = 2n - 2$. Докажите, что число деревьев с n вершинами, у которых степень i -й вершины равна d_i , равно $\frac{(n-2)!}{(d_1-1)!\dots(d_n-1)!}$.

Это утверждение можно переформулировать так:

$$(x_1 + \dots + x_n)^{n-2} = \sum_T x_1^{\deg_T(1)-1} \dots x_n^{\deg_T(n)-1},$$

где сумма берется по всем деревьям T с n вершинами, а через $\deg_T(i)$ обозначена степень i -й вершины в дереве T .

- 3.4.** а) Докажите, что дереве нет непустых подграфов, у которых степень каждой вершины четная и положительная.
 б) Для графа G обозначим через $h_1(G)$ число его подграфов без изолированных вершин, у которых степень каждой вершины четна. (Пустой подграф удовлетворяет этому условию). Докажите, что $h_1(G)$ — степень двойки. Выразите $h_1(G)$ через количество вершин v , ребер e и компонент связности k графа.
 в) На ребрах дерева стоят знаки $+$ и $-$. Разрешается менять знаки на всех ребрах, выходящих из одной вершины. Тогда из любой расстановки можно получить любую другую.
 г) Докажите, что в предыдущем пункте достаточно уметь менять знаки только в вершинах, в которые входят лишь ребра с одним знаком.
 д) Назовем две расстановки знаков $+$ и $-$ на ребрах графа эквивалентными, если одна получается из другой преобразованиями из пункта в). Обозначим через $h^1(G)$ число классов эквивалентности расстановок знаков. Докажите, что оно является степенью двойки, и выразите его через v , e и k .
 е*) Докажите, что $h_1(G)$ и $h^1(G)$ не меняются при стягивании ребра, и выведите отсюда, что $h_1(G) = h^1(G)$.