

Основные свойства лагранжева формализма:

(А) Одна и та же механическая система задается классом эквивалентности лагранжианов L_f :

$$L_f(q, \dot{q}, t) = L_0(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt}(f(q, t)) \quad (**)$$

где f — произвольная достаточно число раз дифференцируемая функция.

Более того, для всего класса L_f уравнения Эйлера-Лагранжа совпадают тождественно.

Для доказательства надо проверить:

$$\left(\frac{d}{dt} \circ \frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \right) \frac{df(q, t)}{dt} \equiv 0, \quad \forall \alpha. \quad (\text{проверьте})$$

Свойство (**) обобщает утверждение о том, что потенциальная энергия $U(q, t)$ определена с точностью до константы. И это содержательное обобщение.

В частности, оно гарантирует физическую неразличимость наблюдений свободной частицы в двух ИСО, одна из которых движется равномерно и прямолинейно относительно другой. Действительно, для одномерной свободной частицы:

$$L_0 = \frac{m}{2} \dot{x}^2. \quad \text{В движущейся системе}$$

$$\dot{x}'(t) = \dot{x}(t) + v, \text{ поэтому}$$

$$L' = \frac{m}{2} \dot{x}'^2 = \frac{m}{2} (\dot{x} + v)^2 = \frac{m \dot{x}^2}{2} + \frac{d}{dt} \left(m v x + \frac{m v^2 t}{2} \right)$$

$$L' = L_0 + \frac{d}{dt} \left(m v x + \frac{m v^2 t}{2} \right),$$

откуда следует тождественность уравнений Э.-Л.
в двух системах отсчёта.

В) Лагранжев формализм ковариантен
при, так называемых, точечных заменах
координат; если на ^(расширенном) конфигурационном простран-
стве системы есть две системы координат
 $\{q_\alpha\}$ и $\{y_\alpha\}$, связанных обрат-
ным преобразованием

$$y_\alpha = y_\alpha(q, t),$$

причем в координатах $\{y_\alpha\}$ система задается
лагранжианом $L^{(y)}(y, \dot{y}, t)$, то в координатах
 $\{q_\alpha\}$ она задается лагранжианом

$$L^{(q)}(q, \dot{q}, t) = L^{(y)}(y(q, t), \dot{y}(q, t), t)$$

Доказательство этого утверждения сводится к
проверке того, что уравнение Э.-Л., отвечаю-
щие лагранжианам $L^{(q)}$ и $L^{(y)}$ связаны обрат-
ным линейным преобразованием, а значит тож-
дественно:

$$L_{\alpha}^{(q)} = L_{\beta}^{(y)} \frac{\partial y_{\beta}}{\partial q_{\alpha}}$$

Действительно, т.к. $\frac{\partial \dot{y}_{\beta}}{\partial \dot{q}_{\alpha}} = \frac{\partial y_{\beta}}{\partial q_{\alpha}}$, то

$$\begin{aligned} L_{\alpha}^{(q)} &= \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - \frac{\partial}{\partial q_{\alpha}} \right) L^{(y)}(y(q,t), \dot{y}(q,t), t) = \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L^{(y)}}{\partial \dot{y}_{\beta}} \frac{\partial y_{\beta}}{\partial q_{\alpha}} \right) - \left(\frac{\partial L^{(y)}}{\partial y_{\beta}} \frac{\partial y_{\beta}}{\partial q_{\alpha}} - \frac{\partial L^{(y)}}{\partial \dot{y}_{\beta}} \frac{\partial \dot{y}_{\beta}}{\partial q_{\alpha}} \right) = \\ &= \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L^{(y)}}{\partial \dot{y}_{\beta}} - \frac{\partial L^{(y)}}{\partial y_{\beta}} \right) \frac{\partial y_{\beta}}{\partial q_{\alpha}} + \frac{\partial L^{(y)}}{\partial \dot{y}_{\beta}} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial y_{\beta}}{\partial q_{\alpha}} - \frac{\partial \dot{y}_{\beta}}{\partial q_{\alpha}} \right) = \\ &= L_{\beta}^{(y)} \frac{\partial y_{\beta}}{\partial q_{\alpha}} \quad \square \end{aligned}$$

Заключается, т.к. $\frac{d}{dt}$ и $\frac{\partial}{\partial q_{\alpha}}$ коммутируют при действии на $y_{\beta}(q,t)$.

(e) Если лагранжиан системы не зависит от какой-то обобщенной координаты q_{α_0} , т.е.

$\frac{\partial L}{\partial q_{\alpha_0}} = 0$, то выполняется закон сохранения соответствующего ей обобщенного импульса

$$P_{\alpha_0} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha_0}} = \text{const}$$

Это очевидно следует из уравнения Э.-Л. L_{α_0}

Координата q_α в таком случае называется циклической.

C2 Если лагранжиан системы не зависит явно от времени - $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, то выполняется закон сохранения энергии

$$E \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - L = \text{const} \quad (***)$$

Проверяем:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \sum_{\alpha} \left(\cancel{\ddot{q}_{\alpha}} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} + \dot{q}_{\alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) \right) - \\ &\quad - \left(\sum_{\alpha} \left(\dot{q}_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} + \cancel{\ddot{q}_{\alpha}} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \right) = \\ &= \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} - \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} \right) - \frac{\partial L}{\partial t} = \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} L_{\alpha} - \frac{\partial L}{\partial t} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

заключается на траекториях движения системы

по условию

Формула (***) даёт общее определение энергии системы, пригодное не только в нерелятивистской механике.

В релятивистской механике её можно преобразовать к привычному виду. Дело в том, что дифференциальный оператор $\sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_{\alpha}}$ на одно-

родных множителях от переменных $\ddot{q}^\alpha$ общей степени K — $P^{(K)}(\ddot{q}^\alpha, \dots)$ — действует так:

произвольная зависимость от других переменных

$$\sum_{\alpha} \ddot{q}^\alpha \frac{\partial}{\partial \ddot{q}^\alpha} P^{(K)} = K P^{(K)}$$

В частности, на кинетической энергии: $\sum_{\alpha} \ddot{q}^\alpha \frac{\partial T}{\partial \ddot{q}^\alpha} = 2T$,

на потенциальной $\sum_{\alpha} \ddot{q}^\alpha \frac{\partial U}{\partial \ddot{q}^\alpha} = 0$, поэтому

$\sum_{\alpha} \ddot{q}^\alpha \frac{\partial L}{\partial \ddot{q}^\alpha} = 2T$, если $L = T - U$, и получаем

$$E = 2T - (T - U) = T + U \quad \leftarrow \text{знаковая формула.}$$