

1. Частица движется в фазовом пространстве с каноническими координатами $\vec{x} = \{x_i\}_{i=1,2,3} \in \mathbb{R}^3$, $\vec{p} = \{p_i\}_{i=1,2,3} \in \mathbb{R}^3$. Известно, что величины

$$B_i = \frac{|\vec{x}| + 1}{|\vec{x}|} x_i + (\vec{x}, \vec{p}) p_i, \quad i = 1, 2, 3$$

являются интегралами движения. Докажите, что компоненты вектора момента импульса частицы $\vec{M} = \vec{x} \times \vec{p}$ также являются интегралами движения.

2. Внутренние степени свободы закреплённой в пространстве квантовой частицы (скажем, электрона в ловушке) описываются нормированным вектором 2-мерного комплексного пространства.

$$|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2, \quad \|\phi\|^2 = \sum_i |\phi_i|^2 = 1.$$

В эксперименте измеряются компоненты вектора спина частицы \vec{S} , задаваемые операторами $\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2}\sigma_i$, $i = 1, 2, 3$, где σ_i — матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Квантовая частица находится в состоянии, про которое известно, что вероятность получить при измерении наблюдаемой S_1 значение $\frac{\hbar}{2}$ равна $\rho_{S_1=\hbar/2} = \sin^2 \omega$, где $\omega \in [0, \pi/2]$ — параметр задачи.

- a) Найдите общий вид состояния $|\phi\rangle$, удовлетворяющего условию задачи. Однозначно ли оно определено?
- b) Для каждого из построенных в пункте а) состояний рассчитайте вероятность $\rho_{S_2=\hbar/2}$ получить при измерении наблюдаемой S_2 значение $\hbar/2$. При каких условиях на ω возможно, чтобы $\rho_{S_2=\hbar/2} = \rho_{S_1=\hbar/2}$? Однозначно ли фиксируется состояние $|\phi\rangle$ заданием значений $\rho_{S_1=\hbar/2}$ и $\rho_{S_2=\hbar/2}$?

3. Внутренние степени свободы закреплённой в пространстве квантовой частицы (например, атома в кристалле) описываются нормированным вектором 3-мерного комплексного пространства.

$$|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3, \quad \|\phi\|^2 = \sum_i |\phi_i|^2 = 1.$$

В эксперименте измеряются компоненты вектора спина частицы \vec{S} , задаваемые операторами $\hat{S}_i = \hbar J_i$, $i = 1, 2, 3$, где J_i — 3×3 матрицы вида

$$J_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

удовлетворяющие коммутационным соотношениям

$$[J_i, J_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} J_k.$$

Динамика частицы задается оператором Гамильтона

$$\hat{H} = \hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Определите возможные результаты измерения энергии частицы и состояния, в которых она может оказаться после измерения.
- б) С какой вероятностью мы получим все возможные значения проекции спина S_3 , если до измерения система находилась в основном состоянии (т.е., состоянии с наименьшим значением энергии).
- в) Вычислите среднее значение и дисперсию проекции спина S_2 при измерении ее в основном состоянии.
- г) Предполагая, что в начальный момент времени $t = 0$ частица находилась в состоянии $|\phi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ с равновероятно распределенным значением проекции спина S_3 , определите ее состояние в произвольный момент времени. Вычислите вероятность обнаружить частицу в момент времени t снова в состоянии $|\phi_0\rangle$.
Меняется ли со временем вероятность обнаружить частицу в состоянии с определенным значением энергии? (ответьте на вопрос для каждого возможного значения энергии) Почему?
- д) В условиях пункта г) определите среднее значение проекции спина S_2 в произвольный момент времени t .

4. Внутреннее состояние системы из двух взаимодействующих квантовых частиц описывается вектором

$$|\phi^{(1)}\rangle \otimes |\phi^{(2)}\rangle \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2,$$

а ее эволюция во времени задается оператором Гамильтона

$$\hat{H} = \frac{1}{\hbar} \left(\hat{\vec{S}}^{(1)}, \hat{\vec{S}}^{(2)} \right) + \frac{\beta}{2} \hat{S}_3^{(1)} + \frac{1}{2\beta} \hat{S}_3^{(2)},$$

где $\hat{\vec{S}}^{(1)}$ и $\hat{\vec{S}}^{(2)}$ — операторы спина первой и второй частицы (см. задачу 2). Первое слагаемое гамильтониана описывает взаимодействие спинов частиц, а два последних — действие на частицы внешнего магнитного поля, направленного вдоль оси $O\vec{z}$. Параметр $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ характеризует магнитное поле.

- а) Определите возможные значения энергии системы и отвечающие им векторы состояния.
б) Какие из наблюдаемых величин

$$\left(\hat{\vec{S}} \right)^2 = \left(\hat{\vec{S}}^{(1)} + \hat{\vec{S}}^{(2)} \right)^2; \quad \hat{S}_3 = \hat{S}_3^{(1)} + \hat{S}_3^{(2)}; \quad \left(\hat{\vec{S}}^{(1)} \right)^2; \quad \hat{S}_3^{(1)}$$

сохраняются при эволюции системы всегда? Какие сохраняются лишь при определенных значениях параметра β ?

- в) В начальный момент времени $t = 0$ система находилась в состоянии

$$|\Psi(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Какова вероятность наблюдать в момент времени t систему в состоянии $|\Psi(t)\rangle$ равном

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}?$$

- г) Для наблюдаемой $(\hat{S})^2$ определите ее минимальное и максимальное возможные значения, а также состояния, в которых эти значения наблюдаются.
 В условиях пункта в) рассчитайте среднее значение $\langle \hat{S}^2 \rangle$ и дисперсию $\Delta(\hat{S}^2)$ в момент времени t .

5. (необязательная) Постройте реализацию операторов спина \hat{S}_i , $i = 1, 2, 3$, в 4-мерном комплексном пространстве, если известно, что \hat{S}_3 задается диагональной матрицей:

$$\hat{S}_3 = \text{diag}\{3/2, 1/2, -1/2, -3/2\}.$$

Придумайте реализацию операторов спина в комплексном пространстве произвольной размерности.