

Листок 2.

Задача 1. Инвариантные ансамбли vs матрицы Вигнера

Матрицами Вигнера называются эрмитовы матрицы, матричные элементы которых на и выше главной диагонали являются независимыми случайными величинами. Предполагая, что плотности вероятностей матричных элементов матриц Вигнера дифференцируемы, покажите, что единственный пример, когда мера на вещественных (комплексных, кватернионно-вещественных) матрицах Вигнера инвариантна относительно присоединенного действия ортогональной (унитарной, унитарной симплектической) группы, дается мерой вида

$$P(dA) = Z^{-1} \exp(-a\text{Tr}A^2 + b\text{Tr}A) dA$$

Указание:

1) Заметьте, что матрицы перестановки - частный случай унитарных матриц. Покажите, что элементы на главной диагонали одинаково распределены. То же самое справедливо для элементов вне главной диагонали. Таким образом мера задается в терминах двух неизвестных дифференцируемых функций.

2) Чтобы выяснить вид этих функций, попробуйте потребовать инвариантности по отношению к конкретному бесконечно малому унитарному преобразованию типа малого вращения в плоскости натянутой на два базисных вектора. Решите полученные дифференциальные уравнения, и воспользуйтесь тем, что инвариантность плотности требует, чтобы она была функцией следов степеней матрицы A .

Задача 2. СВОЙСТВО МАКСИМАЛЬНОЙ СЛУЧАЙНОСТИ ГАУССОВЫХ АНСАМБЛЕЙ

Покажите, что распределение $P(H) = Z^{-1} \exp[-\text{Tr}(H^2)/2]$ максимизирует функционал «энтропии»

$$S(P) = - \int p(H) \log P(H) d^n H$$

при условии $\mathbb{E}(\text{Tr}(H^2)) = n$, где $n = N + \beta N(N - 1)/2$ — число степеней свободы, а dH - мера лебега в \mathbb{R}^n на n независимых компонент матричных элементов.

Задача 3. МИНИМАЛЬНЫЙ ПРИМЕР ГАУССОВЫХ АНСАМБЛЕЙ

Найдите прямой диагонализацией распределение собственных значений матриц размера 2×2 из гауссовых ортогонального, унитарного и симплектического ансамбля.

а) Рассмотрите вещественную симметричную матрицу $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, с независимыми матричными элементами, $a_{11}, a_{22} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $a_{12} = a_{21} \sim \mathcal{N}(0, 1/\sqrt{2})$. Постройте ортогональные преобразования, диагонализующие эти матрицы. От распределения матричных элементов перейдите к новым переменным — собственным значениям и углу поворота, который задает ортогональное преобразование. Проинтегрируйте по углу и найдите распределение собственных значений.

б)* Попробуйте проделать то же самое для эрмитовых и кватернионно-вещественных эрмитовых матриц 2×2 с нормально распределенными матричными элементами, применив для диагонализации унитарные и симплектические матрицы

соответственно. В кватернионном случае можно думать о кватернионах как о матрицах 2×2 , построенных из матриц Паули, $e_0 = I_2, e_k = i\sigma_k, k = 1, 2, 3$. Вещественный кватернион в таком представлении имеет вид

$$\begin{pmatrix} z & w \\ -w^* & z^* \end{pmatrix},$$

где z и w - комплексные числа.

Задача 4. ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ВЫРОЖДЕНИЕ КРАМЕРА

1. Убедитесь, что вещественно-кватернионная эрмитова матрица $X = X^+ \in \mathbb{H}^{N \times N}$ коммутирует с оператором обращения времени $T = Z_{2N}C$, где $Z_{2N} := e_2 \otimes I_N$, а C — комплексное сопряжение, действующее на кватернионы следующим образом $Ce_kC = (-1)^k e_k, k = 0, \dots, 3$. (Буквально комплексным сопряжением оператор C будет, если реализовать кватернионы в терминах матриц Паули, $e_0 = I_2, e_k = i\sigma_k, k = 1, 2, 3$, а кватернионно вещественные матрицы X как комплексные блочные матрицы из $\mathbb{C}^{2N \times 2N}$, построенные из блоков 2×2).

2. Покажите, что матрицы, коммутирующие с оператором обращения времени, имеют двояко вырожденный спектр.

1) Предположим ϕ собственный вектор X с собственным значением λ . Покажите, что $T\phi$ — тоже собственный вектор с собственным значением λ .

2) Используя свойство $T^2 = -I_N$, покажите что эти вектора ортогональны.

Задача 5. КРУГОВЫЕ АНСАМБЛИ

Выведите распределение собственных значений случайных матриц в ортогональном, унитарном и симплектическом круговых ансамблях.

Задача 6. АНСАМБЛЬ ВИШЕРТА

Мера Вишера — многомерное обобщение распределения χ^2 . Пусть $X \in \mathbb{R}^{N \times p}$ — вещественная, $\beta = 1$, комплексная, $\beta = 2$ или кватернионно-вещественная, $\beta = 4$, матрица с независимыми нормально распределенными матричными элементами, независимые вещественные компоненты которых имеют дисперсию $1/\beta$, и $N < p$.

1) Покажите, что эрмитова матрица $A = X^+X$ распределена по закону

$$P(dA) = C^{-1} e^{-\frac{\beta}{2} \text{Tr}(A)} (\det A)^{\beta a/2} \prod_{i \leq j} dA_{ij}, \quad (1)$$

где $a = p - N + 1 - 2/\beta$.

Указание: Один из способов - использовать соответствие между распределениями и производящими функциями моментов (или характеристическими функциями). Вычислите производящую функцию вида

$$M_A(\Theta) := \mathbb{E} \exp \left(\sum_i \Theta_{ii} A_{ii} + 2 \sum_{i < j} \Theta_{ij} A_{ij} \right) = \mathbb{E} \exp \text{Tr} (\Theta^+ A),$$

двумя способами: прямым интегрированием по мере на матрицах X и интегрированием по мере (1). Здесь Θ — постоянная эрмитова вещественная (комплексная,

кватернионно-вещественная) матрица. При этом воспользуйтесь тем, что матрица Θ приводится к диагональной матрице D соответствующим унитарным преобразованием $\Theta = UDU^+$, а так же тем фактом, что меры Лебега на матрицах X и A инвариантны относительно преобразований $X \rightarrow UX$ и $A \rightarrow UAU^+$ соответственно.

2) Покажите, что распределение собственных значений матрицы A имеет вид

$$f(\lambda_1, \dots, \lambda_N) = Z^{-1} e^{-\frac{\beta}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i} \prod_{i=1}^N \lambda_i^{\beta a/2} \prod_{i < j} |\lambda_i - \lambda_j|^\beta.$$

Задача 7. ВАРИАЦИОННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАСТУРА-МАРЧЕНКО.

Плотность распределения собственных значений выборочной ковариационной матрицы $N \times N$ имеет вид

$$f(\lambda_1, \dots, \lambda_N) = Z^{-1} e^{-\frac{\beta}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i} \prod_{i=1}^N \lambda_i^{\beta a/2} \prod_{i < j} |\lambda_i - \lambda_j|^\beta, \quad (2)$$

где $\beta = 1, 2, 4$ и $a = \alpha N$. Предположим, что при $N \rightarrow \infty$ случайная эмпирическая спектральная мера

$$L_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{\lambda_i/N},$$

стремится к некоторой детерминистической мере L_∞ с конечным носителем, в том смысле, что для любой ограниченной непрерывной функции $f(x)$ предел среднего вида $N^{-1} \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^N f(\lambda_i/N) \right)$ вычисляется как

$$\lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^N f(\lambda_i/N) \right) = \int f(x) dL_\infty(x).$$

а) Стартуя с плотности (2) сформулируйте вариационную задачу о нахождении предельной эмпирической меры.

б) Запишите решение вариационной задачи в виде интегрального уравнения и, продифференцировав его, с помощью формул Сохоцкого-Племеля запишите задачу Римана-Гильберта для преобразования Стильтьеса от L_∞ .

в) Решите полученную задачу и, обратив преобразование Стильтьеса, выведите распределение Пастура-Марченко.

Задача 8. ФОРМУЛА ГЕЙНЕ ДЛЯ УНИТАРНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ МНОГОЧЛЕНОВ.

Пусть

$$P_n(x) = x^n + \dots, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

система унитарных многочленов, ортогональных относительно меры $\alpha(x)$,

$$\int P_n(x) P_m(x) d\alpha(x) = h_n \delta_{n,m}.$$

Докажите, что $P_n(x)$ можно представить в виде

$$P_n(x) = \frac{1}{n!D_{n-1}} \mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n (x - x_i) \right],$$

где матожидание вычисляется относительно меры

$$\mu(dx_1 \times \dots \times dx_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 d\alpha(x_1) \dots d\alpha(x_n),$$

и $D_n = \det \left[\int x^{i+j} d\alpha(x) \right]_{0 \leq i, j \leq n}$.

Задача 9. ЛЕММА КРИСТОФЕЛЯ-ДАРБУ

Рассмотрите систему унитарных многочленов

$$p_n(x) = x^n + \dots,$$

ортогональных относительно веса $w(x)$ с нормировкой

$$\langle p_k, p_m \rangle := \int p_k(x) p_m(x) w(x) dx = \delta_{k,m} h_m, \quad k, m = 0, 1, \dots,$$

которые удовлетворяют трёхчленным рекуррентным соотношениям

$$p_{k+1}(x) + (A_k - x)p_k(x) + B_k p_{k-1}(x) = 0,$$

где

$$A_k = \frac{\langle xp_k, p_k \rangle}{h_k} \quad \text{и} \quad B_k = \frac{h_k}{h_{k-1}}.$$

Пусть

$$\psi_n(x) := p_n(x) \sqrt{\frac{w(x)}{h_n}}$$

соответствующий базис Фурье, а

$$K_N(x, y) := \sum_{n=0}^{N-1} \psi_n(x) \psi_n(y)$$

проектор ранга N . Докажите формулы Кристофеля-Дарбу

$$K_N(x, y) = \gamma_N \frac{\psi_{N-1}(x) \psi_N(y) - \psi_N(x) \psi_{N-1}(y)}{y - x}$$

и

$$K_N(x, x) = \gamma_N (\psi'_N(x) \psi_{N-1}(x) - \psi_N(x) \psi'_{N-1}(x)),$$

где $\gamma_k = \sqrt{h_k/h_{k-1}}$.

Задача 10. МАТРИЦА ЯКОБИ

В условиях предыдущей задачи бесконечная матрица вида

$$Q = \begin{pmatrix} A_0 & \gamma_1 & 0 & 0 & \cdot \\ \gamma_1 & A_1 & \gamma_2 & 0 & \cdot \\ 0 & \gamma_2 & A_2 & \gamma_3 & \cdot \\ 0 & 0 & \gamma_3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix},$$

называется матрицей Якоби. Докажите следующие формулы для представления ортогональных многочленов и ядра

$$p_N(x) = \det_{N \times N}(x - Q), \quad K_N(x, y) = \frac{\sqrt{w(x)w(y)}}{h_{N-1}} \det_{(N-1) \times (N-1)} [(x - Q)(y - Q)],$$

где определители понимаются как главные миноры порядка N .

Задача 11. АНСАМБЛЬ ЛАГЕРРА-ВИШЕРТА

Плотность распределения собственных значений ковариационных выборочных матриц из ансамбля Лагерра-Вишерта имеет вид

$$f(\lambda_1, \dots, \lambda_N) = Z^{-1} e^{-\frac{\beta}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i} \prod_{i=1}^N \lambda_i^{\beta a/2} \prod_{i < j} |\lambda_i - \lambda_j|^\beta,$$

где $\lambda_i \in [0, \infty)$ (см. Листок 1.).

Используя многочлены Лагерра, $L_n^{(a)}(x)$ (необходимые справочные сведения приведены в конце задачи), постройте корреляционное ядро $K_N(x, y)$, для случая $\beta = 2$ и $a \geq 0$. Проведите его асимптотический анализ в различных пределах:

1. Выведите уравнение на производящую функцию многочленов Лагерра из трёхчленных рекуррентных соотношений и, решив его, покажите, что производящая функция имеет вид

$$G^{(a)}(x, t) := \sum_{k=0}^{\infty} L_k^{(a)}(x) t^k = \frac{\exp\left(-\frac{tx}{1-t}\right)}{(1-t)^{a+1}}.$$

Запишите интегральное представление многочленов Лагерра.

2. Исследуйте поведение полученного интеграла в пределе $N \rightarrow \infty$, считая что $0 \leq a \leq \infty$ остается конечной величиной, и выведите предельные формулы для корреляционного ядра в различных скейлинговых пределах:

- (а) Покажите, что средняя плотность

$$\rho(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} K_N(Nx, Nx)$$

дается частным случаем распределения Пастура-Марченко. Его можно переписать как как четвертькруговой закон — половину полукруглого закона Вигнера. Объясните эту связь.

- (b) Покажите, что во внутренней части спектра, $0 < w < 4$, предельное корреляционное ядро

$$K_{\infty}^{\text{bulk}}(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\rho(w)} K_N \left(Nw + \frac{x}{\rho(w)}, Nw + \frac{y}{\rho(w)} \right)$$

не зависит от референтной точки w и стремится к синус-ядру.

- (c) Покажите что при некотором выборе константы σ корреляционное ядро в окрестности правого края спектра (режим мягкого края, soft edge)) сходится к ядру Эйри

$$\begin{aligned} K_{\infty}^{\text{soft edge}}(x, y) &:= \lim_{N \rightarrow \infty} N^{1/3} \sigma K_N(4N + \sigma N^{1/3}x, 4N + \sigma N^{1/3}y) \\ &= \frac{Ai(x)Ai'(y) - Ai(y)Ai'(x)}{x - y} \\ K_{\infty}^{\text{soft edge}}(x, y) &= K_{Airy}(x, y). \end{aligned}$$

- (d) Покажите, что на левой границе спектра (в режиме жесткого края, hard edge scaling limit) корреляционное ядро сходится к ядру Бесселя

$$\begin{aligned} K_{\infty}^{\text{hard edge}}(x, y) &\doteq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{4N} K_N \left(\frac{x}{4N}, \frac{y}{4N} \right) \\ &= \frac{J_a(\sqrt{x})\sqrt{y}J'_a(\sqrt{y}) - J_a(\sqrt{y})\sqrt{x}J'_a(\sqrt{x})}{2(x - y)}. \end{aligned}$$

- (e) Убедитесь, что при $a = \pm 1/2$ мы возвращаемся к четной и нечетной части синус ядра, а в пределе $a \rightarrow \infty$, когда левый край отодвигается от твердой стенки, к ядру Эйри.

Используйте следующие справочные формулы:

Многочлены Лагерра $L_k^{(a)}(x)$ ортогональны в $L_2([0, \infty), w(x)dx)$ с весом $w(x) = x^a e^{-x}$. Для решения достаточно знать коэффициент при старшем члене

$$L_n^{(a)}(x) = x^n \frac{(-1)^n}{n!} + \text{члены более низких порядков}$$

норму¹

$$\langle L_n^{(a)}, L_m^{(a)} \rangle = \frac{\Gamma(n + a + 1)}{n!} \delta_{n,m},$$

а так же коэффициенты трехчленных рекуррентных соотношений

$$-(n + 1)L_{n+1}^{(\alpha)}(x) + (2n + \alpha + 1 - x)L_n^{(\alpha)}(x) - (n + \alpha)L_{n-1}^{(\alpha)}(x) = 0.$$

Функции Эйри и Бесселя можно понимать в смысле их интегральных представлений, например

$$\begin{aligned} Ai(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(z t + t^3/3)} dt \\ J_a(z) &= \frac{\left(\frac{1}{2}z\right)^a}{2\pi i} \int_{-\infty}^{(0+)} \exp\left(t - \frac{z^2}{4t}\right) \frac{dt}{t^{a+1}}, \end{aligned}$$

¹Заметьте, что при таком традиционном определении, многочлены Лагерра не являются ни унитарными ни нормированными на единицу.

или любых других. В последнем интеграле контур интегрирования начинается в $-\infty - i0$, заканчивается в $-\infty + i0$ и обходит разрез функции t^{a+1} , проведенный вдоль отрицательной части действительной оси.

Задача 12. Число частиц в детерминантном точечном процессе

Пусть $(\mathfrak{X}, \text{Conf}(\mathfrak{X}), \mathbb{P})$ – детерминантный точечный процесс, задаваемый корреляционным ядром $K_n : \mathfrak{X} \times \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{C}$, которое определяет линейный оператор $\widehat{K}_n : L_2(\mathfrak{X}, \mu) \rightarrow L_2(\mathfrak{X}, \mu)$,

$$\widehat{K}_n f(x) = \int_{\mathfrak{X}} K_n(x, y) f(y) d\mu(y), \quad f(x) \in L_2(\mathfrak{X}, \mu),$$

являющийся проектором, $\widehat{K}_n^2 = \widehat{K}_n$, на подпространство размерности n , т.е. $\dim \text{Im} \widehat{K}_n = n$. Докажите, что общее число частиц в этом процессе почти наверное равно n ,

$$\mathbb{P}(\nu(\mathfrak{X}) = n) = 1.$$

Задача 13. Число частиц в интервале в гауссовом унитарном ансамбле и пуассоновском процессе.

Рассмотрите гауссов унитарный ансамбль матриц $n \times n$, где плотность распределения собственных значений имеет вид

$$f_{\Lambda_n}^{\text{G},\beta}(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{Z_n^{\text{GUE}}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} |x_i - x_j|^2.$$

Пусть $E_n(L) := \nu([-L/\sqrt{n}, L/\sqrt{n}])$ – число собственных значений в отрезке $[-L/\sqrt{n}, L/\sqrt{n}]$ и $E(L) := \lim_{n \rightarrow \infty} E_n(L)$ в смысле моментов. Вычислите дисперсию $\mathbb{D}(E(L))$ случайной величины $E(L)$ и докажите, что имеет место предел

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{D}E(L)}{\ln L} = \frac{1}{\pi^2}.$$

Проделайте то же самое для пуассоновского точечного процесса с интенсивностью ρ в \mathbb{R}^d для куба $[-L, L]^d$, а также вычислите вероятность отсутствия частиц в этом кубе