

# Прикладные методы анализа – 2024

- 1 Интегралы типа Коши и их граничные значения.  
Формулы Сохоцкого-Племеля
- 2 Обобщенные функции
- 3 Гармонические функции и краевые задачи
- 4 Теория потенциала
- 5 Цилиндрические и сферические функции

Цилиндрические и сферические функции естественным образом возникают при попытке решить уравнение Гельмгольца

$$\Delta u = -\lambda u,$$

т.е. уравнение на собственные значения и собственные функции оператора Лапласа, соответственно в круге (размерность  $d = 2$ ) и в шаре ( $d = 3$ ) с нулевыми граничными условиями.

**Игрушечный пример: отрезок ( $d = 1$ ).** Чтобы дать наглядное представление о том, что мы собираемся делать в размерностях 2 и 3, мы начнем с “игрушечного” примера в размерности  $d = 1$ , где аналогом шара служит отрезок прямой (скажем,  $[0, L]$ ).

Оператор Лапласа в одномерии – это просто оператор взятия второй производной  $\partial_x^2$ . Задача нахождения его собственных значений и собственных функций возникает при решении уравнения поперечных колебаний струны

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

где  $u = u(x, t)$  имеет смысл поперечного смещения точки  $x$  струны (которое предполагается малым по сравнению с длиной струны) в момент времени  $t$ . Это так

называемое волновое уравнение в одном измерении, о котором мы подробнее поговорим позже. Константа  $c$  имеет смысл скорости распространения колебаний вдоль струны, поскольку общее решение волнового уравнения на всей прямой, как нетрудно понять, имеет вид

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct),$$

где  $F$  и  $G$  – произвольные (дважды дифференцируемые) функции одной переменной. Первое слагаемое представляет собой возмущение, бегущее со скоростью  $c$  направо с сохранением своей формы, а второе – налево, и общее решение – их суперпозиция. Мы, однако, будем интересоваться решениями на отрезке  $[0, L]$  с нулевыми граничными условиями  $u(0, t) = u(L, t) = 0$  (струна с закрепленными концами). В этом случае решение в виде суперпозиции бегущих волн не годится.

Мы воспользуемся методом разделения переменных, который заключается в том, чтобы искать решение в виде  $u(x, t) = f(x)g(t)$ , где  $f$  – функция только от  $x$ , а  $g$  – только от  $t$ . Подставляя этот анзац в волновое уравнение, будем иметь

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)}.$$

Левая часть – функция только от  $x$  и не зависит от  $t$ , правая – функция только от  $t$  и не зависит от  $x$ . Следовательно, обе части должны быть равны одной и той же константе, которую мы обозначим  $-k^2$ :

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)} = -k^2.$$

Тем самым имеем уравнения на функции  $f$  и  $g$ :

$$\begin{cases} f''(x) + k^2 f(x) = 0, \\ g''(t) + c^2 k^2 g(t) = 0. \end{cases}$$

Из граничных условий  $u(0, t) = f(0)g(t) = 0$ ,  $u(L, t) = f(L)g(t) = 0$  вытекает, что  $f(0) = f(L) = 0$ . Для функции  $g(t)$  никаких дополнительных условий не возникает. Итак, нам нужно решить задачу

$$\begin{cases} f''(x) + k^2 f(x) = 0, \\ f(0) = f(L) = 0, \end{cases}$$

т.е. найти значения  $k^2$  при которых существуют решения и найти эти решения. Это простейший пример задачи Штурма-Лиувилля. Таким образом, задача о колебаниях струны с закрепленными концами свелась к задаче о нахождении собственных значений и собственных функций оператора  $\partial_x^2$  на отрезке.

Легко видеть, что при  $k^2 < 0$  наша задача не имеет решений. При  $k^2 > 0$  общее решение уравнения  $f'' + k^2 f = 0$  имеет вид

$$f(x) = a \cos kx + b \sin kx.$$

Из граничных условий  $a = 0$ ,  $b \sin kL = 0$ , откуда находим возможные значения  $k$ :

$$k = \frac{\pi n}{L}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Мы нашли собственные значения оператора  $\partial_x^2$ , равные  $-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , и отвечающие им собственные функции

$$f_n(x) = \sin \frac{\pi n x}{L}.$$

Общее решение уравнения на функцию  $g$  при  $k = \pi n/L$  имеет вид

$$g_n(t) = A_n \cos \frac{\pi n c t}{L} + B_n \sin \frac{\pi n c t}{L},$$

где  $A_n$ ,  $B_n$  – произвольные коэффициенты, тогда

$$u_n(x, t) = f_n(x)g_n(t) = \left( A_n \cos \frac{\pi n c t}{L} + B_n \sin \frac{\pi n c t}{L} \right) \sin \frac{\pi n x}{L},$$

а общее решение волнового уравнения для струны с закрепленными концами – их суперпозиция

$$u(x, t) = \sum_{n \geq 1} u_n(x, t).$$

Скажем несколько слов о смысле полученного решения  $u_n(x, t)$ . Тождества для тригонометрических функций позволяют представить его в виде

$$u_n(x, t) = C_n \cos(\omega_n t - \delta_n) \sin \frac{\pi n x}{L},$$

где

$$C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad \delta_n = \arctg \frac{B_n}{A_n}, \quad \omega_n = \frac{\pi n c}{L}.$$

Эта формула означает, что каждая точка струны  $x_0$  совершает гармонические колебания с амплитудой  $C_n \left| \sin \frac{\pi n x_0}{L} \right|$ , что представляет собой стоячую волну. Величины  $\omega_n$  называются собственными частотами колебаний струны, наименьшая из них,  $\omega_1 = \pi c/L$ , – основной тон.

Наконец, укажем, как полученное решение позволяет решить задачу с заданными начальными условиями  $u(x, 0) = \varphi(x)$ ,  $u_t(x, 0) = \psi(x)$  (от этих функций мы требуем, чтобы  $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ ,  $\psi(0) = \psi(L) = 0$ ). Разложим функции  $\varphi$ ,  $\psi$  в ряды Фурье:

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{\pi n x}{L}, \quad \varphi_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(\xi) \sin \frac{\pi n \xi}{L} d\xi, \\ \psi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{\pi n x}{L}, \quad \psi_n = \frac{2}{L} \int_0^L \psi(\xi) \sin \frac{\pi n \xi}{L} d\xi. \end{aligned}$$

Тогда формулы

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{\pi n x}{L} = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi n c}{L} B_n \sin \frac{\pi n x}{L} = \psi(x) \end{aligned}$$

позволяют отождествить

$$A_n = \varphi_n, \quad B_n = \frac{L}{\pi n c} \psi_n,$$

что и решает задачу с начальными условиями.

**Цилиндрические функции, функции Бесселя.** Волновое уравнение в двух измерениях имеет вид

$$u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}), \quad u = u(x, y, t).$$

Оно описывает поперечные колебания плоской мембраны. Разделяя переменные, т.е. ища решение в виде  $u(x, y, t) = f(x, y)g(t)$ , приходим к уравнению на собственные значения двумерного оператора Лапласа  $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$ :

$$\Delta f + k^2 f = 0.$$

Рассмотрим колебания круглой мембраны радиуса  $R$  с закрепленной границей. В этом случае граничные условия имеют вид

$$f(x, y) \Big|_{\sqrt{x^2+y^2}=R} = 0,$$

и  $f$  должна быть ограниченной функцией при  $x^2 + y^2 \leq R^2$ .

Для решения задачи удобно перейти к полярным координатам  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$  и искать решения уравнения  $\Delta f + k^2 f = 0$  методом разделения переменных в виде  $f(x, y) = F(r)\Phi(\varphi)$ . Запишем оператор Лапласа в полярных координатах:

$$\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Подстановка анзаца  $f(x, y) = F(r)\Phi(\varphi)$  в уравнение дает:

$$r^2 \left( \frac{1}{rF} \partial_r (r \partial_r F) + k^2 \right) = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda,$$

где  $\lambda$  обязана быть константой, т.к. левая часть зависит только от  $r$ , а правая – только от  $\varphi$ . Отсюда получаем уравнения на функции  $F$ ,  $\Phi$ :

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dF}{dr} \right) + \left( k^2 - \frac{\lambda}{r^2} \right) F = 0, \\ \Phi'' + \lambda \Phi = 0. \end{cases}$$

Очевидно, функция  $\Phi$  должна быть периодичной,  $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ , т.е. представлять собой линейную комбинацию функций  $\sin nx$ ,  $\cos nx$  с целым  $n$ . Отсюда мы заключаем, что  $\lambda = n^2$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ . Введя новую переменную  $x = kr$  и функцию  $y(x) = F(r) = F(x/k)$ , так что  $F' = ky'$ , запишем первое уравнение в виде

$$\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left( x \frac{dy}{dx} \right) + \left( 1 - \frac{n^2}{x^2} \right) y = 0$$

или

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left( 1 - \frac{n^2}{x^2} \right) y = 0.$$

В частности, если  $\Phi = \text{const}$ , то  $n = 0$ , и мы имеем уравнение

$$y'' + \frac{1}{x} y' + y = 0.$$

В более общем случае рассматривают уравнение, в котором  $n = \nu$  не обязательно целое:

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right) y = 0.$$

Это уравнение называется уравнением Бесселя. Его решения (не равные тождественно нулю) называются цилиндрическими функциями. Прямой подстановкой нетрудно проверить, что одно из решений дается рядом

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}.$$

По признаку Даламбера ряд сходится при всех  $x$  и задает функцию  $J_\nu(x)$ , которая называется функцией Бесселя порядка  $\nu$ .

Напомним определение и основные свойства Г-функции, входящей в коэффициенты ряда для функции Бесселя:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt,$$

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad \Gamma(n+1) = n! \text{ при } n \in \mathbb{Z}_+, \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$$

Функция  $\Gamma(x)$  регулярна при  $x > 0$  и имеет полюсы первого порядка при  $x = -n$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$

Функции Бесселя с полуцелым  $\nu$  выражаются через элементарные функции. Например:

$$\begin{aligned} J_{1/2}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x, \\ J_{-1/2}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x. \end{aligned}$$

Если  $\nu$  не является целым числом,  $J_{-\nu}(x)$  есть второе линейно-независимое решение уравнения Бесселя. Если  $\nu = n \in \mathbb{Z}$ , то легко видеть, что

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x),$$

т.е. функции  $J_{-n}(x)$  и  $J_n(x)$  линейно зависимы. В этом случае второе линейно-независимое решение не ограничено при  $x \rightarrow 0$ . Приведем без доказательства выражение для асимптотики функции Бесселя при  $x \rightarrow +\infty$ :

$$J_\nu(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O(x^{-3/2}).$$

Возвращаясь к нашей задаче на собственные значения, пишем решение уравнения

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) y = 0$$

в виде

$$y(x) = J_n(x).$$

Наложение граничного условия  $y(kR) = 0$  приводит к задаче о нахождении нулей функции Бесселя на положительной части вещественной оси, т.е. к решению

уравнения  $J_n(\mu) = 0$ . Корни этого уравнения  $\mu_1^{(n)} < \mu_2^{(n)} < \mu_3^{(n)} < \dots$  являются трансцендентными. Их бесконечно много, и  $\mu_m^{(n)} \rightarrow \infty$  при  $m \rightarrow \infty$ . Тем самым для собственных значений двумерного оператора Лапласа имеем

$$k_{n,m}^2 = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\right)^2,$$

а собственная функция дается формулой  $J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}r}{R}\right)\Phi_n(\varphi)$ , где  $\Phi_n(\varphi)$  – линейная комбинация функций  $\cos n\varphi$  и  $\sin n\varphi$ .

**Другие цилиндрические функции.** Наряду с функциями Бесселя большое значение для приложений имеют и другие цилиндрические функции. Приведем определение некоторых из них.

Функция Неймана  $N_\nu(x)$  определяется формулами

$$\begin{aligned} N_\nu(x) &= \frac{1}{\sin \pi \nu} \left( J_\nu(x) \cos \pi \nu - J_{-\nu}(x) \right), \quad \nu \notin \mathbb{Z}, \\ N_n(x) &= \frac{1}{\pi} \left( \frac{\partial J_\nu(x)}{\partial \nu} - (-1)^n \frac{\partial J_{-\nu}(x)}{\partial \nu} \right) \Big|_{\nu=n}, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Функции Ханкеля первого и второго рода определяются формулами

$$H_\nu^{(1)}(x) = J_\nu(x) + iN_\nu(x),$$

$$H_\nu^{(2)}(x) = J_\nu(x) - iN_\nu(x).$$

Асимптотика функции Неймана при  $x \rightarrow +\infty$  имеет вид

$$N_\nu(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\pi \nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O(x^{-3/2}).$$

Из сравнения с аналогичной формулой для функции Бесселя видно, что функция Бесселя аналогична косинусу, а функция Неймана – синусу, в то время как функции Ханкеля аналогичны экспонентам от мнимого аргумента типа  $e^{\pm ix}$ . Однако, в отличие от тригонометрических функций многие цилиндрические функции неограниченно возрастают при  $x \rightarrow +0$ . Например, лидирующая асимптотика функции  $N_0(x)$  при  $x \rightarrow +0$  такова:  $N_0(x) = \frac{2}{\pi} \log x + \dots$ . Имеются также аналоги экспоненты от действительного аргумента  $e^{\pm x}$  – цилиндрические функции мнимого аргумента  $I_\nu(x)$  и  $K_\nu(x)$ .

**Сферические функции.** Сферические функции возникают при решении задачи на собственные значения для оператора Лапласа  $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$  в трехмерном шаре:

$$\Delta u + k^2 u = 0, \quad u = u(x, y, z)$$

с условием  $u = 0$  на границе шара радиуса  $R$ . Естественно перейти к сферическим координатам  $r, \theta, \varphi$  по формулам  $x = r \sin \theta \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \theta \sin \varphi$ ,  $z = r \cos \theta$  ( $\theta$

меняется в промежутке от 0 до  $\pi$ , а  $\varphi$  – от 0 до  $2\pi$ ). Оператор Лапласа в сферических координатах принимает вид

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\theta,\varphi},$$

где

$$\Delta_{\theta,\varphi} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Разделение переменных  $u(r, \theta, \varphi) = f(r)v(\theta, \varphi)$  дает соотношение

$$\frac{(r^2 f')' + k^2 r^2 f}{f} = -\frac{\Delta_{\theta,\varphi} v}{v} = \mu,$$

в котором левая часть зависит только от  $r$ , а правая только от угловых координат  $\theta, \varphi$ , и потому обе они должны быть равны некоторой константе, которую мы обозначили через  $\mu$ . Отсюда получаем уравнения

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} (r^2 f')' + \left( k^2 - \frac{\mu}{r^2} \right) = 0 & \text{с условием } f(R) = 0, \\ \Delta_{\theta,\varphi} v + \mu v = 0. \end{cases}$$

Рассмотрим первое уравнение. Предположим, что  $k \neq 0$  и сделаем в первом уравнении замену переменных

$$x = kr, \quad y(x) = \sqrt{x} f(x/k),$$

тогда это уравнение принимает вид

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left( 1 - \frac{\mu + \frac{1}{4}}{x^2} \right) = 0,$$

что есть ни что иное, как уравнение Бесселя, так что его решениями являются какие-то цилиндрические функции. Но мы пока не можем сказать, какие именно, т.к. не знаем, какие значения может принимать  $\mu$ .

Для выяснения этого вопроса надо рассмотреть второе уравнение, в которое входит то же самое  $\mu$ . Его решение – функция  $v(\theta, \varphi)$  – должно быть регулярно при всех  $0 \leq \theta \leq \pi$  и периодично с периодом  $2\pi$ :  $v(\theta, \varphi + 2\pi) = v(\theta, \varphi)$ . Эти требования и дают ограничения на возможные значения  $\mu$ . Будем решать второе уравнение тем же методом разделения переменных, представив решение в виде  $v(\theta, \varphi) = P(\cos \theta)\Phi(\varphi)$ , что дает

$$\frac{\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left( \sin \theta \frac{dP(\cos \theta)}{d\theta} \right) + \mu \sin^2 \theta P(\cos \theta)}{P(\cos \theta)} = -\frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)} = m^2,$$

откуда получаем уравнения

$$\begin{cases} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left( \sin \theta \frac{dP(\cos \theta)}{d\theta} \right) + \left( \mu - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) P(\cos \theta) = 0, \\ \Phi''(\varphi) + m^2 \Phi(\varphi) = 0. \end{cases}$$

Второе уравнение имеет периодические решения только если  $m \in \mathbb{Z}$ :  $\Phi(\varphi) = e^{im\varphi}$ . Рассмотрим первое уравнение и сделаем в нем замену  $t = \cos \theta$ ,  $t \in [-1, 1]$ , тогда оно примет вид

$$\frac{d}{dt} \left[ (1 - t^2) \frac{dP}{dt} \right] - \frac{m^2}{1 - t^2} + \mu P = 0$$

или

$$(1 - t^2)P'' - 2tP' - \frac{m^2}{1 - t^2}P + \mu P = 0.$$

Следующее простое наблюдение позволяет свести анализ этого уравнения к случаю  $m = 0$ . Произведя замену

$$P(t) = (1 - t^2)^{m/2}p(t),$$

получим для функции  $p(t)$  уравнение

$$(1 - t^2)p'' - 2(m + 1)tp' + (\mu - m(m + 1))p = 0.$$

Продифференцировав уравнение с  $m = 0$   $m$  раз, получим для функции  $P^{(m)}(t) = \partial_t^m P(t)$  то же самое уравнение, что мы вывели для  $p(t)$ . Отсюда делаем вывод, что решение уравнения с  $m \neq 0$ , которое мы обозначим  $P^m(t)$ , связано с решением  $P^0(t)$  уравнения с  $m = 0$  формулой

$$P^m(t) = (1 - t^2)^{m/2} \frac{d^m P^0(t)}{dt^m}.$$

Учитывая сказанное, сосредоточимся на уравнении

$$(1 - t^2)P'' - 2tP' + \mu P = 0.$$

Мы должны выяснить, при каких значениях  $\mu$  у него есть решения, регулярные на отрезке  $[-1, 1]$ . При этом 1 и  $-1$  являются особыми точками этого уравнения (поскольку коэффициент при старшей производной в этих точках обращается в 0), и существование регулярных решений на всем отрезке  $[-1, 1]$  не очевидно и требует исследования. Нормируем решения условием  $P(1) = 1$  и будем искать решения в окрестности точки 1 в виде ряда по степеням  $s = t - 1$ :

$$P(1 + s) = 1 + \sum_{k \geq 1} \alpha_k s^k.$$

Прямая подстановка этого ряда в уравнение дает рекуррентное соотношение для коэффициентов  $\alpha_k$ :

$$\alpha_{k+1} = \frac{\mu - k(k+1)}{2(k+1)^2} \alpha_k$$

с “начальным условием”  $2\alpha_1 = \mu$ . В случае если  $\mu \neq k(k+1)$  при каком-либо целом  $k$ , все коэффициенты ряда ненулевые, и по формуле для радиуса сходимости находим, что он равен 2. Это означает, что в точке  $-1$  (которая как раз находится на расстоянии 2 от точки 1) регулярность решения может нарушаться. В случае  $\mu = n(n+1)$  при  $n \in \mathbb{N}$  ряд обрывается на  $n$ -м члене и решение представляет собой полином степени  $n$ . Строгое доказательство того, что при других значениях  $\mu$  ограниченных и квадратично интегрируемых решений нет, можно найти в книге [9]. Итак, мы выяснили, что при  $\mu = n(n+1)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , у нашего уравнения есть регулярное решение  $P_n(t)$ , представляющее собой полином.

Запишем уравнение в виде

$$(1 - t^2)P_n'' - 2tP_n' + n(n + 1)P_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Его регулярное решение  $P_n(t)$  является полиномом степени  $n$ , который называется *полиномом Лежандра*. Для полиномов Лежандра существует явная формула (формула Родрига):

$$P_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n.$$

Нормировочный множитель выбран так, что  $P_n(1) = 1$ . Вот несколько первых полиномов Лежандра:

$$P_0(t) = 1, \quad P_1(t) = t, \quad P_2(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}, \quad P_3(t) = \frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t.$$

Из формулы Родрига очевидно, что  $P_n(-t) = (-1)^n P_n(t)$ .

Функции

$$P_n^m(t) = (1 - t^2)^{m/2} \frac{d^m}{dt^m} P_n(t)$$

удовлетворяют уравнению

$$(1 - t^2)(P_n^m)'' - 2t(P_n^m)' - \frac{m^2}{1 - t^2} P_n^m + n(n + 1)P_n^m = 0$$

и называются *присоединенными функциями Лежандра*.

Итак, мы нашли решения уравнения на собственные значения угловой части оператора Лапласа

$$\Delta_{\theta, \varphi} v + n(n + 1)v = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

в разделенных переменных:

$$v(\theta, \varphi) = Y_n^m(\theta, \varphi) = P_n^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad n = 0, 1, \dots, \quad m = 0, \pm 1, \dots, \pm n.$$

Функции  $Y_n^m(\theta, \varphi)$  называются *сферическими функциями*.

Теперь вернемся к уравнению Бесселя на радиальную часть собственной функции трехмерного оператора Лапласа, которое при  $\mu = n(n + 1)$  примет вид

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left(1 - \frac{(n + \frac{1}{2})^2}{x^2}\right) = 0.$$

Отсюда следует, что радиальная часть собственной функции выразится через функцию Бесселя с полуцелым индексом:

$$f(r) = \frac{1}{\sqrt{kr}} J_{n+\frac{1}{2}}(kr)$$

и принадлежит классу элементарных функций.

Наконец, обсудим случай  $k = 0$ , когда исходная задача сводится к нахождению гармонических функций в пространстве и при наложении нулевого граничного условия на сфере радиуса  $R$  имеет только тривиальное решение. Поэтому при  $k = 0$  надо

отказаться от этого условия. При  $k = 0$  и  $\mu = n(n + 1)$  уравнение на радиальную часть принимает вид

$$f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) - \frac{n(n+1)}{r^2} f(r) = 0.$$

У него есть два линейно-независимых решения:  $f(r) = r^n$  и  $f(r) = r^{-n-1}$ . Следовательно, частными решениями уравнения Лапласа в пространстве являются функции

$$r^n Y_n^m(\theta, \varphi) \quad \text{и} \quad r^{-n-1} Y_n^m(\theta, \varphi).$$

Гармоническая функция общего вида представляется как линейная комбинация этих функций. Например, в таком виде можно искать решение задачи Дирихле. Отметим, что функция  $r^n Y_n^m(\theta, \varphi)$  представляет собой гармонический однородный полином от  $x, y, z$  степени  $n$ .

## Список литературы

- [1] М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат, *Методы теории функций комплексного переменного*, Наука, Москва, 1973.
- [2] Ф.Д. Гахов, *Краевые задачи*, Наука, Москва, 1977.
- [3] И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов, *Обобщенные функции и действия над ними*, Москва, 1959.
- [4] В.С. Владимиров, *Уравнения математической физики*, Наука, Москва, 1985.
- [5] В.С. Владимиров, В.В. Жаринов, *Уравнения математической физики*, Москва, 2000.
- [6] А.Н. Тихонов, А.А. Самарский, *Уравнения математической физики*, Наука, Москва, 1977.
- [7] P. Wiegmann, A. Zabrodin, *Conformal maps and integrable hierarchies*, Communications in Mathematical Physics, **213** (2000) 523–538.
- [8] В.И. Арнольд, *Лекции об уравнениях с частными производными*, Фазис, Москва, 1999.
- [9] А.Ф. Никифоров, В.Б. Уваров, *Специальные функции математической физики*, Наука, Москва, 1984.